

# 노로바이러스 식중독 예방법



# 노로바이러스 식중독 대응요령



비누를 사용하여 30초 손씻기



채소, 과일은 깨끗한 물로 세척하기



생식을 삼가고 중심온도 85°C 1분 이상 가열하기



물 끓여 마시기



조리도구는 끓이거나 염소소독하기



주변환경 청결히 하기

1



배탈, 설사, 구토 등 식중독 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문하여 의사의 지시를 따릅니다.

2



집단 설사환자가 발생하면 가까운 보건소에 신고하여 2차 피해를 예방합니다.

4




조리자가 식중독 증상이 있는 경우 즉시 음식물 조리를 중단해야 합니다.

3



노로바이러스 식중독 증상이 회복된 후 최소 일주일 이상 조리과정에 참여하지 않도록 합니다.

# 노로바이러스 식중독 이렇게 예방하세요!



# 노로바이러스 식중독 발생 현황

5년 평균('12년~'16년) 기준 \*겨울철(12월~2월)



19.6%

연간 식중독 환자수

전체 ..... 6,325명  
노로바이러스 1,239명



56.5%

겨울철 식중독 환자수

전체 ..... 823명  
노로바이러스 465명




41%

겨울철 식중독 발생건수

전체 ..... 61건  
노로바이러스 25건

◆ 5년('12~'16년) 평균 월별 노로바이러스 발생건수 (월/건)



## ● 노로바이러스란?

급성위장염을 일으키는 전염성 강한 바이러스

## ● 노로바이러스 특성?


- 한여름철을 제외한 시기에 식품 및 환자와 직·간접적인 접촉을 통해 감염
- 낮은 온도(-20℃)에서도 오래 생존
- 소량(10개)으로도 발병가능
- 구토물, 분변 1g당 1억개의 노로바이러스 존재
- 구토물에 오염된 손으로 만진 문고리 등을 통해서도 감염 가능

## ● 노로바이러스 증상?

- 감염후 24~48시간 후에 메스꺼움, 구토, 설사, 탈수, 복통, 근육통, 두통 등을 일으킴
- 통상 3일 이내 회복되나 1주간 분변으로 바이러스는 계속 배출



# 노로바이러스 식중독 주요 감염경로



# 노로바이러스 구토물 처리방법

