


가정

노로바이러스 의심 환자 발생시 행동요령 및 예방법



- 가족 중에 설사 및 구토 환자 발생 시
가족 간 접촉 주의
※ 신속한 병원진료 필요
- 증상소실 전까지 집단생활시설
(학교, 학원 등) 등원 자제

- 식사 전, 배변 후, 조리 전,
구토물 등 처리한 후 손 씻기
- 음식 섭취 시 개인 식기 사용
- 수건은 개인별로 사용 및 화장실 등 공동
사용 공간은 가급적 구분 생활 권고
- 증상이 있는 가족은 조리 금지



- 화장실에서 용변 또는 구토 후 변기 뚜껑은 꼭 닫고 물내리고,
구토물 주변은 3m 이상 소독하기
- 가족 간 접촉이 많은 문고리, 수도꼭지, 손잡이 소독하기



노로바이러스 알아보기

감염경로 | 식품 및 감염 모두 가능
주요특징 | 대표적인 바이러스성 식중독균으로 전염성이 높음

잠복기 | 평균 24~48시간
주요증상 | 묽은 설사변과 설사 또는 구토 2~3일간 지속되는 낮은 발열, 탈수, 호흡기 증상

노로바이러스 예방



손은 흐르는 물에
비누로 30초 이상 자주 씻기



식재료는 깨끗한 물로 세척하기
다른 식재료에 튀지 않게 주의



음식은 충분히 익혀먹기
어패류는 중심온도 85°C, 1분 이상 익히기



지하수 사용 시
염소소독장치 정상 작동여부 확인

액상 소독제 만드는 방법

5% 이상 유효염소농도
제품 기준

일상 시(0.1% 농도, 1000ppm)



※ 가정용 염소 뚜껑 1개 가득 또는 종이컵 바닥에서 약 0.5cm 정도

발생 시(0.5% 농도, 5000ppm)



※ 소독액은 환기가 잘되는 곳에서 고무장갑을 착용 후 제조하시기 바랍니다.

구토물 소독처리

